Blue

y su familia juntos por un mundo sin leishmaniosis

¿Qué es la leishmaniosis?

La leishmaniosis está causada por un parásito (*Leishmania*), que se introduce en el animal mediante la **picadura de un insecto** de pequeño tamaño parecido a un mosquito (Flebotomo).

Los síntomas que presenta un perro con leishmaniosis son muy variables, pero los más frecuentes son las lesiones en la piel (úlceras, descamación, etc.) y, en los casos más graves, afecta al hígado y al riñón.

Tu veterinario te explicará por qué es una zoonosis...



La leishmaniosis es una enfermedad que puede afectar al perro, a otros mamíferos pero también al **hombre.** Está presente en 98 países de todo el mundo y en Europa es muy común en la cuenca Mediterránea.

En Europa, los casos en personas y perros están aumentando en estos últimos años debido al cambio climático.

¡¡¡Pregunta en tu clínica veterinaria cómo combatirla para que todos estemos protegidos!!!

¿Cómo prevenirla?

- **Collares y/o pipetas:** evitan o disminuyen el contacto con el "mosquito".
- **Vacunas:** disminuyen el riesgo de desarrollar la enfermedad. La vacunación prepara a mis defensas frente al parásito de la leishmaniosis por si un "mosquito" infectado me llegara a picar.
- **Evitar dormir al aire libre:** especialmente en zonas endémicas, si no llevara protección, podría llegar a recibir hasta 100 picaduras cada noche.
- Evitar los paseos en las horas de más actividad del "mosquito" (**amanecer** o **atardecer**).
- Evitar las zonas de riesgo de contagio como espacios con **acúmulo de materia orgánica,** ya que es el lugar de puesta de huevos del "mosquito".

¿Cuál es el mejor momento para llevar a Blue a vacunar?

La primera dosis de la vacunación frente a la leishmaniosis puede aplicarse a partir de los **6 meses** de edad. Se recomienda que hayan transcurrido un mínimo de 15 días después de recibir el resto de vacunas.

Es importante estar pendiente de los recordatorios que te envía tu clínica veterinaria para que te acuerdes de la revacunación anual de esta enfermedad.

¿Pueden vacunarse todos los perros?

En primer lugar, el veterinario deberá asegurarse de que estoy **sano.** En la consulta me explorará ampliamente y me tomará una muestra de sangre para analizarla. Si los análisis confirman que soy **SERONEGATIVO**, ya estoy listo para ser vacunado.

Una vez vacunado... ¿Qué puedo esperar?

Al igual que el resto de vacunas que recibo anualmente, tras la administración de la vacuna frente a la leishmaniosis puedo tener alguna molestia.

Deben pasar unos días hasta que la vacuna me proteja. Al tratarse de una vacuna frente a una enfermedad parasitaria, no estaré 100% protegido, sin embargo, el riesgo de desarrollar la leishmaniosis disminuirá.

Una vez protegido... ¿Podrían aparecer síntomas compatibles con la leishmaniosis?

A pesar de las medidas de protección que me han aplicado, podría presentar síntomas sugestivos de leishmaniosis.

Mi veterinario tendrá que explorarme y sacarme sangre para realizar una analítica.

Esta analítica será fiable porque no existe riesgo de interferencia con la vacuna.

Y si se confirma que tengo leishmaniosis...

Mi veterinario iniciará un tratamiento para mejorar los síntomas, pero gracias a estar vacunado la enfermedad cursará de forma más leve y la recuperación será más rápida.

Si ya he estado enfermo ¿puedo olvidarme de la protección frente a la leishmaniosis?

Una vez esté recuperado, debo seguir protegiéndome porque en cualquier momento puede volver a picarme un nuevo "mosquito". Mi familia me lleva al veterinario rutinariamente para seguir estando protegido.

Fuentes: 1. Campaña de diagnóstico y prevención de enfermedades transmitidas por vectores. COVB 2013.
2. Revista auxiliar veterinario. Nº 16. Publicación avalada por AMVAC. **3.** Información técnica del producto LetiFend (Laboratorios Leti). **4.** Guías Leishvet. **5.** Leishmaniosis in vaccinated dogs: clinical aspects. Abstract aceptado en la 27th Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP 2019).
6. Vaccine. Nov 2019 .Vaccination with LetiFend® reduces circulating immune complexes in dogs experimentally infected with L. infantum. Cacheiro-Llaguno C[1], Parody N[1], Renshaw-Calderón A[2], Osuna C[1], Alonso C[2], Carnés J[3].

LETIPharma
desde 1919

Consulta a tu veterinario

Para más información, consulta la web:
www.porunmundosinleishmaniosis.com

LETI
POR UN MUNDO SIN
LEISHMANIOSIS

46097040