



## Información sobre inmunoterapias

<b>Cuánto tarda en fabricarse una inmunoterapia</b>	3-4 semanas desde el pedido.
<b>Qué duración tienen las inmunoterapias</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subcutánea INICIO 3 viales A (verde), B (azul) y C (naranja): .....7 meses.</li> <li>• Subcutánea INICIO RÁPIDO 2 viales C (naranja): .....7 meses.</li> <li>• Subcutánea MANT 2 viales C (naranja): .....8 meses.</li> <li>• SLIT INICIO 2 viales C (naranja): .....6 meses.</li> <li>• SLIT MANT 3 viales: .....9 meses.</li> </ul>
<b>Se puede combinar la inmunoterapia con fármacos</b>	Sí, la inmunoterapia se puede combinar con cualquier fármaco.
<b>Puedo administrar otras vacunas si está tomando inmunoterapia</b>	Sí, pero debemos evitar hacerlo el mismo día.
<b>Por qué el transporte de las inmunoterapias no se realiza refrigerado</b>	Viajan a temperatura controlada (<25°C). Las proteínas que llevan las inmunoterapias son estables mientras no se superen varias horas los 52°C.
<b>Cuánto tiempo se recomienda mantener la inmunoterapia</b>	Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda un mínimo de 4 años.
<b>Cuando hace tiempo que se ha suspendido la inmunoterapia, cómo se debe retomar</b>	Si la inmunoterapia lleva más de 6 meses suspendida, se debe empezar con el protocolo de inicio. Si la suspensión es menor de 6 meses, se retoma con el protocolo mensual.